

## **ESTERON® TEN TEN**

INGREDIENTE ACTIVO	2,4-D butotilo
NOMBRE QUIMICO	Éster butotílico del ácido 4-(2,4-diclorofenoxi) butírico
GRUPO QUIMICO	Acidos fenoxicarboxílicos
CONCENTRACION Y FORMULACION	659 g/L (430 g/Kg de equivalente ácido de 2,4-D. EC (Concentrado Emulsionable)
MODO DE ACCION	Sistémico.
FABRICANTE / FORMULADOR	Dow AgroSciences, USA; Dow AgroSciences, Brasil.
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Dow AgroSciences Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo II. Producto moderadamente peligroso LD 50 producto comercial: dermal = 1.300 mg/kg oral = 1.627 mg/kg
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico.
AUTORIZACION SAG N°	3.030

### **PRINCIPALES CARACTERISTICAS**

**ESTERON® TEN TEN** es un herbicida hormonal que en aplicación postemergente, controla en forma eficiente malezas de Hoja ancha en Cero labranzas, cultivos de Cereales y Plantaciones forestales.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

<b>Cultivo</b>	<b>Malezas controladas</b>	<b>Dosis (L/ha)</b>	<b>Observaciones</b>
Cero labranzas, Barbechos químicos y Regeneración de Praderas.	Arvejilla, Cardos, Hierba del chanco, Rábano, Yuyo, Mostaza, Mostacilla, Diente de león, Correhuela,	0,5 – 1	Aplicar sobre malezas en sus primeros estados. Usar las dosis máximas, para malezas que no se encuentren en este estado de desarrollo.
Trigo, Avena, Cebada, Centeno	Siete venas		
Plantaciones de Pino Insigne		0,75 – 1	<b>Aplicación de Preplantación:</b> Aplicar en la habilitación de sitios en control de malezas herbáceas en preplantaciones.
		2 - 3	Control de pinos de regeneración natural.

**PERIODO DE CARENCIA (días):** No corresponde para todos los cultivos.

**OBSERVACIONES:** **ESTERON® TEN TEN** dará los mejores resultados al ser aplicado sobre malezas que estén creciendo activamente antes que hayan emitido el tallo floral. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 20°C. Se recomienda calibrar el equipo para aplicar con presiones bajas (inferiores a 30 lbs o 300 Kpa.). En aplicaciones terrestres usar barra aplicadora con boquillas de abanico plano, aplicando un volumen no inferior a 100L de agua por ha. Usar dosis mayores frente a malezas de mayor desarrollo.

**COMPATIBILIDADES:** En Cero labranzas, Barbechos químicos y Regeneración de praderas, **ESTERON® TEN TEN** puede ser mezclado con Panzer® ó Panzer® Gold para el control simultaneo de gramíneas. **ESTERON® TEN TEN** es compatible también con Starane® Xtra, Triazinas, Combo®, Tordon® y Lontrel®.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con herbicidas de contacto.

**FITOTOXICIDAD:** No contaminar agua de regadío que puedan regar cultivos sensibles. Evitar deriva a cultivos de hoja ancha y frutales.

**NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES:** 2 aplicaciones por temporada con al menos 30 días entre ellas para aplicaciones terrestres o aéreas.

**APLICACIONES AEREAS:** Puede aplicarse por vía aérea, en cero labranza y forestales. Utilizar 40 L agua/ha. Observar disposiciones de la autoridad competente.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Esperar 12 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas o animales al área tratada.

® Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC.